

Mięczaki

Mięczaki dzielą się na dwie gromady:

1. małże (Bivalvia),
2. ślimaki (Gastropoda)



fot. Andrzej Martin Kasiński



fot. Andrzej Martin Kasiński

Racicznica

Dreissena polymorpha

Racicznica, mięczak zaliczany do rzędu blaszkoskrzelnych właściwych, **gromady małżów**, zamieszkujący wody słodkie i o niskim zasoleniu, osiąga wielkość do 4 cm. Osobniki dorosłe prowadzą osiadły tryb życia, larwy mogą pływać swobodnie co powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się racicznicy w zbiorniku wodnym.

[więcej >>](#)

Szczeżuja wielka

(Anodonta cygnea)

Szczeżuja wielka jest największym bezkręgowcem słodkowodnym. Długość: 7-20 cm. Jest mięczakiem z **gromady małżów**.

[>>> szczeżuja więcej](#)



fot. Andrzej Martin Kasiński

Szczeżuja pospolita

(Anodonta anatina)

Szczeżuja pospolita długość: 6-10 cm.
Jest mięczakiem z gromady małżów.

Szczeżuje są szersze i bardziej spłaszczone w stosunku do skójek.

Skójka jest bardziej smukła.

>> więcej



fot. Andrzej Martin Kasiński

Skójka

(Unio pictorum)

Mięczak z gromady małżów.

>> więcej



fot. Andrzej Martin Kasiński

Żyworódka

(Viviparus Viviparus)

Ślimak przodoskrzelny. Rodzina żyworódki. Wysokość 3-4cm, szerokość 2-3cm. Barwa muszli zielonobrazowa z trzema ciemnymi paskami.



fot. Andrzej Martin Kasiński

Zagrzebka

(Bithynia tentaculata)

Ślimak przodoskrzelny. Rodzina wodożytkowate. Wysokość 10-15mm, szerokość 6-10m. Barwa ciemno brązowa do czerwonej. Składa jaja, rozdzielnopłciowa.



fot. Andrzej Martin Kasiński

Błotniarka stawowa

(Lymnea Radix)

Błotniarka jest **ślimakiem** płucodyszny (czyli oddychającym powietrzem atmosferycznym). Jest najbardziej pospolicie występującym ślimakiem słodkowodnym.

[więcej >>](#)



fot. Andrzej Martin Kasiński

Mulik

(Rddix [Lymnaea] auricularia)

Rodzina błotniarkowate. Wysokość 2,5-3,5cm, szerokość 2-3cm. Posiada przezroczystą muszlę o banieczkowatym kształcie (krótka i szeroka). Ostatni zwój duży, z zaokrąglonym obrzeżem ujścia.

[więcej >>](#)



fot. Andrzej Martin Kasiński

Zatoczek rogowy

(Planorbarius corneus)

Występuje w wodach stojących, posiada rozszerzające się zwoje, całkowicie zaokrąglone. Barwa muszli od oliwkowej do brązowo-czarnej. Średnica muszli do 35mm, grubość do 12mm.

[wiecej >>](#)



fot. Andrzej Martin Kasiński

Zagrzebka sklepiona

(Bithynia leachi)

Mały ślimak, wielkość muszki do 13-15mm, muszla prawoskrętna. Rogi białe, wąskie, ciało granatowo-czarne z żółtymi drobnymi kropkami. Należy do rodziny ślimaków przodoskrzelnych.

[>>](#)