



IANTD/IANC, Inc.

Cave Diver Egzamin



Instrukcje: Na początku zapoznaj się dokładnie z treścią każdego pytania. Wcześniej, zanim zaznaczysz wybraną przez siebie odpowiedź, dokładnie rozważ wszystkie możliwości i wybierz tę właściwą. Jeżeli zmienisz zdanie co do odpowiedzi przekreśl tę niewłaściwą, a ponownie zaznacz tę, która jest według Ciebie prawdziwa. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 80% dobrych odpowiedzi.

Odpowiedzi zaznacz na załączonym do testu formularzu odpowiedzi, nie pisz po formularzu z pytaniami!

1. Prawidłowe oddychanie w nurkowaniu jaskiniowym jest:
 - a. Szybkie i głębokie
 - b. Powolne i szybkie
 - c. Szybki wdech z powolnym pełnym wydechem i 5 sekund przerwy pomiędzy oddechami
 - d. Wolny pełny wdech i wydech z nie więcej niż 5 sekund przerwy między wdechem i wydechem
2. Głównym czynnikiem powodującym śmiertelne wypadki u certyfikowanych nurków jaskiniowych jest:
 - a. Zawalenie się jaskini
 - b. Błąd człowieka
 - c. Awaria sprzętu
 - d. Utknięcie w restrykcji
3. Największy stres pochodzi z:
 - a. Rozdzielenia z partnerem
 - b. Nurkowania w nowym sprzęcie w nowej jaskini
 - c. Całkowitej utraty widoczności
 - d. Czynników skumulowanych
4. Behavioralnie, symptomem percepcyjnego zawężenia jest:
 - a. Kiedy zahaczmy się w poręczówkę i czujemy, że: "nie mogę się ruszyć", a nie rozumiemy z jakiego powodu
 - b. Patrząc naprzód zdajemy sobie sprawę że jaskinia jest coraz mniejsza i węższą im dalej płyniemy
 - c. Bycie bardzo pewnym siebie wierząc w pozytywne zakończenie
 - d. Pozostawanie spokojnym i zrelaksowanym
5. Jeśli czujesz się źle i bardzo niekomfortowo podczas wizualizacji przed nurkowaniem:
 - a. Odwołaj nurkowanie
 - b. Zignoruj uczucie i zrób nurkowanie
 - c. Nurkuj, ale bądź gotowym na wystąpienie czegoś niezwykłego
 - d. Powiedz partnerom nurkowym, żeby zrobili nurkowanie bez Ciebie.
6. Która z poniższych typów jaskiń tworzy się w najkrótszym czasie?
 - a. Jaskinia lawowa
 - b. Jaskinia krasowa
 - c. Jaskinia morska
 - d. Jaskinia magmowa
7. Zdefiniuj następujące:
 - a. Wywierzyisko
 - b. Syfon
 - c. Zapadlisko
 - d. Ponik
8. Podczas nurkowania z nowym partnerem nurkowym:
 - a. Nurkuj w swoich normalnych granicach
 - b. Nurkuj bardziej zachowawczo niż normalnie
 - c. Nurkuj zgodnie z możliwościami nowego partnera
 - d. Nurkuj w pojedynkę i unikaj nowych partnerów
9. Które z poniższych rodzajów mułu spowoduje największe zmniejszenie widoczności podczas nurkowania jaskiniowego?
 - a. Piasek & żwir
 - b. Gлина
 - c. Błoto
 - d. Mung (osady organiczne)

10. Podczas zarządzania ryzykiem powinienem:
- wypisać wszystkie zagrożenia związane z nurkowaniem, ocenić dopuszczalne ryzyko i zaplanować, jak najlepiej radzić sobie z ryzykiem podczas nurkowania
 - Zignorować możliwość dodatkowego ryzyka i mieć pewność, że poradysz sobie z tym, co cię spotka
 - Określić, czy doświadczenie partnerów pozwoli Ci poradzić sobie z każdym wzrostem ryzyka związanego z nurkowaniem
 - Być pewnym, że masz odpowiedni sprzęt aby poradzić sobie z jakimkolwiek problemem związanym ze sprzętem
11. Który typ jaskiń nie jest uważany za jeden z pięciu ogólnych rodzajów podwodnych jaskiń?
- Jaskinie morskie
 - Jaskinie magmowe
 - Jaskinie krasowe
 - Jaskinie lodowcowe
12. Wspólne zagrożenia dla wszystkich podwodnych jaskiń to:
- Muł, bezpośredni dostęp do powierzchni, głębokość, sufit jaskini
 - Ciemność, prąd, woda, światło otoczenia
 - Ciemność, poręczówki, głębokość, konfiguracja jaskini
 - Konfiguracja jaskini, utrata widoczności, nieoczekiwany prąd, głębokość
13. Tolerancję na stres można nabywać w różny sposób. Który sposób jest nie zalecany aby radzić sobie ze stresem?
- Dodatkowy trening
 - Przewidywanie
 - Zbytńia pewność siebie
 - Zapoznanie się ze sprzętem
14. Podczas wychodzenia z nurkowania jaskiniowego ty i twój partner jesteście w sytuacji awaryjnego dzielenia się gazem i spotykacie dwóch innych nurków walczących o powietrze. Waszą najbezpieczniejszą reakcją jest:
- Rozpoczęcie dzielenia się gazem z innymi zagrożonymi nurkami
 - Pchania innych nurków do punktu wyjścia z jaskini
 - Unikać innych nurków i mieć nadzieję, że za tobą popłyną
 - Wyjść z jaskini, pominąć przystanki i uzyskać pomoc
15. Które z poniższych czynników zwiększa podatność na chorobę dekompresyjną?
- Alkohol
 - Odwodnienie
 - Palenie
 - Wszystkie powyższe
16. Podaj przykład każdego z następujących:
- Wysiłku i zimna
 - Przeładowania zadaniami
 - Zagrożenie ego
 - Presja czasu
17. Co nie zapobiega narkozie?
- Zmniejszenie retencji CO₂
 - Budowania tolerancji na narkozę poprzez częste głębokie nurkowanie
 - Unikanie głębokich nurkowań
 - Dużo odpoczynku przed nurkowaniem
18. Kiedy występuje zwiężenie odpowiedzi w stresie, które umiejętności są tracone w pierwszej kolejności?
- Umiejętności dobrze opanowane
 - Umiejętność szybkiego pływania
 - Źle opanowane umiejętności przetrwania
 - Kompleksowe umiejętności udostępniania powietrza w restrykcjach
19. Reakcją na stresującą sytuację powinno być:
- Zwolnij, oddychaj powoli i płyn szybko w kierunku wyjścia
 - Przyspieszyć, spowolnić oddychanie i ustalić, dlaczego jesteś zestresowany
 - Zatrzymaj się, zrób wydech, oddychaj powoli, powtórz to co najmniej trzy razy, a następnie obserwuj i analizuj źródła stresu aby następnie wykorzystać samodyscyplinę i koncentrację, aby rozwiązać problem
 - Obwiniać swojego partnera o zaistniałą sytuację i pokazać mu... środkowy palec.
20. Prowadzisz nurkowanie i rozdzielasz się z partnerem gdy osiągasz ciśnienie zwrotne. Ty:
- Rozpocznij poszukiwanie, aby zobaczyć, czy twój partner cię nie wyprzedził
 - Zatrzymaj się na chwilę aby sprawdzić, czy widać światło w dowolnym kierunku, załóż jakiś wskaźnik na poręczówkę i zacznij wycyfowanie (wyjście), świecąc latarką na boki.
 - Zawiązać linkę kołowrotka do stałej poręczówki i rozpocząć koliste wzory poszukiwania
 - Pływać wzdłuż każdej bocznej poręczówki, wzdłuż której, nurek mógłby przypadkowo popłynąć

21. **Najpoważniejsze** naruszenie techniki poręczowania wymienione poniżej jest:
- Aby pozwolić sobie na płynięcie kilka metrów obok lub powyżej poręczówki
 - Poluzować (nie napinać) linkę kołowrotka, gdy jesteś osobą poręczującą
 - Przejsć pod linią
 - Być za osobą z kołowrotkiem przy wychodzeniu z jaskini
22. Przy wychodzeniu z jaskini właśnie osiągasz 1/3 zużycia gazu i zauważasz, że twój partner zniknął.
Jak długo będziesz go szukać?
- Mogę wyjść w normalnym tempie będąc na regule 1/3 i czujnym okiem będę szukał partnera w drodze do wyjścia.
 - Podzielę moją pozostałą rezerwę gazu na pół i wykorzystam połowę szukając mojego partnera.
 - Zwolnię moje tempo o jedną trzecią i wykorzystam wolniejsze tempo do lokalizowania mojego partnera
 - Wyjdę z jaskini i natychmiast wezwę pomoc aby znaleźć zaginionego partnera

Użyj tabel IANTD i wykresów, gdy odpowiadasz na pytania 23, 24 i 25.

23. Plan:

Robisz nurkowanie na 30 MSW w jaskini, która spada bezpośrednio na 30 MSW i pozostaje stała. Używasz twina 2x12L 240bar.

Twój zmierzony SAC wynosi 0,41 bar / min.

Tempo pływania wynosi 15m / min. Na początku nurkowania masz dokładnie 240 bar w swoich zbiornikach.

- Jaki jest twój punkt zwrotny dla powietrza? bar _____
 - Jaki był czas denny nurkowania, kiedy zawróciłeś? _____
 - Jaką odległość przepłynąłeś do punktu zwrotnego? _____
- d. Podczas powrotu, ze względu na prąd wody płyniesz z **prędkością 18 metrów na minutę**. Odpowiedz na następujące pytania:
- Czas na wyjście to: _____ minut
 - Gaz zużyty po drodze: _____ bar
 - Czas nurkowania do przystanku dekompresyjnego to: _____ minut
 - Jakie są twoje przystanki dekompresyjne? na _____ metrach

24. Załóżmy, że partner miał całkowitą awarię powietrza w punkcie zwrotnym, a prędkość wychodzenia jest zredukowana do 7,5 m na minutę. Czy masz wystarczająco dużo powietrza, aby wyjść z jaskini? _____.

25. Z powyższego nurkowania (pytanie 24) zakładając, że wychodzicie 15 m / min, ale twój partner warunkach stresu podwaja jego tempo oddychania. Czy będziesz miał wystarczająco dużo gazu, aby wyjść z jaskini? _____.